

**2011年8月改訂(第5版、自主改訂)

*2011年1月改訂

貯法	できるだけ湿気を避け、直射日光のあたらない涼しい場所に保管のこと。開封後は特に湿気を避け、フタをよく閉める等取扱いに注意のこと。
----	------------------------------------------------------------------

使用期限：外箱・容器に表示

日本標準商品分類番号	
875200	
承認番号	(62AM)0098
薬価収載	1987年10月
販売開始	1987年10月

漢方製剤 (半夏厚朴湯)

太虎堂の半夏厚朴湯エキス顆粒

〔組成・性状〕

本品4.5g中

日局ハンゲ……………6.0g 日局ソヨウ……………3.0g

日局ブクリョウ……………5.0g 日局ショウキョウ……………1.0g

日局コウボク……………3.0g

上記生薬より抽出した水製乾燥エキス3000mgを含有する。
添加物として日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウムを含有する。

性状：本品は淡灰色～灰褐色の顆粒剤で、特異なにおいがあり、味はわずかになまぐさい。

識別コード： *Tai* TM-16

〔効能・効果〕

気分がふさいで、咽喉、食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声

〔用法・用量〕

通常成人1日4.5gを3回に分割し、食前又は食間に経口投与する。なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

〔使用上の注意〕

1. 重要な基本的注意

(1)本剤の使用にあたっては、患者の証(体質・症状)を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

(2)他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。

**2. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していないため、発現頻度は不明である。

	頻度不明
過敏症 ^{注1)}	発疹、発赤、掻痒等

注1)このような症状があらわれた場合には投与を中止すること。

3. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減量するなど注意すること。

4. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

妊娠中の投与に関する安全性は確立していないので、妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。

5. 小児等への投与

小児等に対する安全性は確立していない。[使用経験が少ない]

〔包装〕

500g、1.5g×84包、1.5g×336包

*〔文献請求先〕

太虎精堂製薬株式会社 薬事情報部
〒651-0076 神戸市中央区吾妻通2丁目1番27号
TEL (078) 232-1015 FAX (078) 232-1077

製造販売元  **太虎精堂** 製薬株式会社
神戸市中央区吾妻通2丁目1の27