

くすりのしおり

2018年3月作成

薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

商品名：太虎堂の竜胆瀉肝湯エキス細粒

主成分：竜胆瀉肝湯（Ryutanshakanto）

剤形：薄茶色～茶色の散

シート記載：Tar TM-76G 竜胆瀉肝湯 2.5g



この薬の作用と効果について

このくすりは漢方薬です。体質や症状に合わせて処方されます。
比較的体力があり、下腹部の筋肉が緊張しやすい人などに用いられます。
通常、排尿痛、残尿感、尿の濁り、おりものなどの治療に用いられます。

次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

用法・用量（この薬の使い方）

- ・ あなたの用法・用量は（医療担当者記入）
- ・ 通常、成人は1日7.5gを3回に分割し、食前または食間に服用します。年齢、体重、症状により適宜増減されます。必ず指示された服用方法に従ってください。
- ・ 飲み忘れた場合は、気がついたときにできるだけ早く飲んでください。ただし、次に飲む時間まで近い場合は飲まないで、その後は指示された時間から飲んでください。2回分を一度に飲んではいけません。
- ・ 誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

生活上の注意

この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、下痢などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 発熱、から咳、息切れ、呼吸困難 [間質性肺炎]
- ・ 尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる [偽アルドステロン症]
- ・ 体がだるくて手足に力が入らない、手足がひきつる、手足がしびれる [ミオパチー]
- ・ 体がだるい、皮膚や白目が黄色くなる [肝機能障害、黄疸]
- ・ 腹痛・便秘・下痢・腹部膨満などを繰り返す [腸間膜静脈硬化症]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光を避け、湿気の少ないところに保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。